

סיכום חיסוני חובה בבעלי כנף

המחלה	ניוקסל	סלמונלה	קדחת מערב הנילוס
מי חייב לחסן?	כל סוגי העופות המופיעים בסעיף I	בעלי כנף שביציהן משמשות למאכל אדם	אווזים
0-14 ימים	חי*: טפטוף לשתי העיניים		מומת: הזרקה תת עורית
2-4 שבועות	מומת: הזרקה תת עורית		
4 שבועות			מומת: הזרקה תת עורית
8 שבועות		מומת: הזרקה תת עורית	
14-16 שבועות	מומת: הזרקה תת עורית	מומת: הזרקה תת עורית	
פעם בשנה	חי*: טפטוף לשתי העיניים + מומת: הזרקה תת עורית	מומת: הזרקה תת עורית	מומת: הזרקה תת עורית
בעלי כנף ממקור חיצוני	חי*: טפטוף לשתי העיניים + מומת: הזרקה תת עורית		

* אין לחסן יונים בתרכיב חי

החיסונים הרשומים מעלה הם חיסוני חובה !!

להמלצות לחיסונים נגד מחלות אחרות יש להתייעץ עם הרופא הווטרינר המטפל.
אפשר לחסן את בעלי החיים הבאים גם כנגד המחלות הבאות (יתכן והרופא המטפל ימליץ על חיסונים אחרים):

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתיה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.

שם הוראת העבודה: הנחיות כלליות למתן היתר להפעלת משק	מס' הוראת טופס: טהע- 04.08	עדכון מס': 3	בתוקף מ: 03/03/10
---	----------------------------	--------------	-------------------

תרנגולות: מארק, אבעבועות, לרינגוטרכאיטיס, גמבורו, ברונכיטוס מדבק, ראו וירוס, פסטרלה, קוקצידיה, דלקת מח נגיפית של תרנגולות.

תרנגולי הודו: TRT, דלקת מעיים דמית, אבעבועות, פסטרלה, רימרלה, ORT, דלקת מח נגיפית של תרנגולי הודו.

פסיונים: לרינגוטרכאיטיס, פסטרלה.

יונים ושלווים: אבעבועות

טווסים: לרינגוטרכאיטיס

- ❖ יש להשתמש בתרכיבי החיסון, תוך הקפדה על הוראות היצרן הרשומות בתוויות ובדברי ההסבר באריזות
- ❖ חיסון המבוצע בהזרקה, מחייב כי כל בעל כנף יקבל מנה אחת של תרכיב באופן שמנת התרכיב בשלמותה תוזרק לגוף העוף
- ❖ חיסון בעירפול או ריסוס יבוצע באופן שיבטיח פיזור אחיד של החיסון.
- ❖ חיסון במי שתייה יבוצע בהתאם להוראות תווית האריזה. יש להשתמש במספר מנות המתאים למספר העופות בלהקה
- ❖ אין להשתמש בתרכיבי חיסון שפג תוקפם (תאריך התפוגה מופיע בכל אריזה).
- ❖ החיסון יבוצע על ידי אחד מהגורמים הבאים בלבד:
 - רופא וטרינר
 - אדם בעל היתר לעסוק בחיסון עופות בהתאם לתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירותיות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר-חיסון עופות), תשנ"ד – 1994.
 - בעל העופות ובלבד שקיבל הנחיות מקצועיות לביצוע החיסונים מהשירותים הווטרינריים.
- ❖ חיסוני חובה: על המגדל לדאוג ולקבל את ההוראות הנוגעות לחיסוני החובה, לפני קבלת להקה. חיסוני החובה מסומנים בכל אחת מתכניות החיסונים.
- ❖ כל סטייה מהוראות החיסון תעשה באישור מוקדם של רופא וטרינר ממשלתי למחלות עופות בלבד.